

¿Por qué proponemos Aborto libre, seguro y gratuito?

1 El aborto existe, es una realidad y aunque se prohíba y castigue, siempre habrá mujeres que aborten.

1 Está demostrado científicamente que los países que permiten interrumpir voluntariamente un embarazo, tienen menos cantidad de abortos. Esto se debe a que, además de legalizar esta práctica, se desarrollan políticas de educación sexual que ayudan a la prevención de embarazos no deseados.

1 Abortar en clandestinidad se constituye en un acto de TORTURA. Esto ocurre cuando las mujeres se deben someter a procedimientos en los que se ocupan técnicas e instrumentos poco higiénicos, dolorosos y violentos para su cuerpo.

1 Cuando una persona con problemas de drogas o alcohol acude a los servicios de salud e incluso en los casos de personas que viven con VIH/SIDA, el Estado no les juzga ni castiga diciéndoles: *¿porqué no lo pensaste antes? Ahora arréglatelas solo!!* Entonces, no aceptamos que a las mujeres se nos castigue con la prohibición absoluta del aborto, por el sólo hecho de habernos descuidado en algún momento, si este ha sido el caso.

1 El derecho a aborto terapéutico fue negado en la dictadura de Pinochet. Su prohibición refleja el propósito de intimidar y coaccionar a mujeres y médicos y trata de imponer una creencia religiosa a costa de la salud.

1 A las feministas nos interesa que las mujeres decidan por si mismas cuándo ser madres y cuántos hijos/as tener. Este es un DERECHO HUMANO y por ello debiese ser legal, seguro y gratuito.

**Educación sexual para decidir,
Anticonceptivos para no abortar,
Aborto legal para no morir.**

Red Salud Mujeres Chile



ABORTO
información segura



88 91 85 90

www.mujiressobrelasolas.org

www.abortoinformacionsegura.blogspot.com

¿CÓMO USAR MISOPROSTOL?

LINEA TELEFÓNICA: Aborto: Información segura

La Línea telefónica **Aborto: Información segura**, es una iniciativa creada por agrupaciones feministas que conforman la Red Salud Mujeres Chile y surge como una medida de extrema urgencia ante la situación del aborto en Chile.

La información que se entrega en la línea está basada en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo es entregar información científica a las mujeres sobre cómo usar un medicamento (misoprostol) que permita interrumpir un embarazo de manera segura y confiable hasta la semana 9.

Puedes recibir información llamando al celular **88918590** (la línea no devuelve llamadas ni contesta mensajes de texto) Las personas que contestan el teléfono han sido capacitadas por profesionales de la salud y no te piden datos personales.

¿Cómo interrumpir un embarazo mediante el uso de misoprostol?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la forma más efectiva y segura de interrumpir un embarazo con misoprostol es el uso **sublingual** de una dosis total de 12 pastillas de 200 mg misoprostol, divididas en 3 dosis de 4 pastillas cada dosis, de la siguiente forma:

1°.- Primero, se colocan **4 pastillas de misoprostol bajo la lengua** (al mismo tiempo las 4). Se espera a que estas se disuelvan, **sin morderlas ni tragarlas**. Esto puede demorar entre 30 minutos y una hora.

2°.- Luego, se esperan **4 horas** y se vuelven a colocar **4 pastillas de misoprostol, de la misma forma que se hizo anteriormente**, esperando a que estas se disuelvan. Dentro de **4 horas más**, se vuelven a colocar **4 pastillas bajo la lengua**, esperando a que estas se disuelvan. Como ya se dijo, son 12 pastillas de misoprostol en total.

¿Qué debería ocurrir en un proceso normal de interrupción del embarazo?

Lo primero que debería ocurrir es que comience un **sangrado abundante, tipo menstruación**, con el mismo olor y color, un poco más abundante que una menstruación común. Este puede comenzar desde la primera dosis, o demorarse un poco más, pero dura entre **10 horas y 2 días** después de comenzarse el proceso. Luego de terminado este sangrado, seguirá un **sangrado de tipo goteo**, que puede durar hasta **3 semanas**.

Son síntomas frecuentes el **dolor tipo cólico menstrual**, un poco más fuerte, para el cual se puede tomar cualquier analgésico, pero **NUNCA** aquellos que se usan típicamente para controlar los dolores menstruales (predual, por ejemplo). Puede también haber **náuseas y/o vómitos**.

¿Qué síntomas indican que algo anda mal?

Aunque no es frecuente, es posible que ocurran complicaciones durante el proceso. Estas pueden ser:

1 **Hemorragia:** Existe hemorragia cuando se llenan más de dos toallas higiénicas normales en una hora durante dos horas (en total, **4 toallas higiénicas en 2 horas**)

1 **Infección:** Existe infección cuando se presenta **fiebre, sangrado con mal olor y sensación de malestar general y debilidad**.

En ambos casos, se debe acudir a un **hospital** con rapidez.

www.mujiresso.org

www.abortoinformacionsegura.blogspot.com